

B. Allgemein empfohlene Impfungen

Allgemeiner Impfkalender für Säuglinge

Tabelle 1

	ab 7. Woche	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	ab 12. Monat
Rotavirus (RTV)	2 bzw. 3x RTV-Impfstoff (Schluckimpfung)						
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HIB) Hepatitis B (HBV)		1. 6-fach Impfung		2. 6-fach Impfung			3. 6-fach Impfung
Konjugierte Mehrfachimpfung gegen Pneumokokken (PNC)		1. PNC- Impfung		2. PNC- Impfung		3. PNC- Impfung	

Allgemeiner Impfkalender für Kleinkinder

Tabelle 2

	13. Monat	14. Monat	15.-19. Monat	20.-24. Monat	3. Lebensjahr	5. Lebensjahr	6. Lebensjahr
Masern Mumps (MMR) Röteln	1.MMR			2. MMR			
Varizellen (VZV)	1. VZV*			ev. 2. VZV*		2. VZV*	
Pneumokokken	4. PNC						
Konjugierte Meningokokken- Impfung (MEC)	1. MEC- Impfung**						
Hepatitis A (HAV)		1. HAV- Impfung		2. HAV- Impfung			
FSME	FSME	FSME		FSME		FSME	

* Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen; ev. auch als MMRV

** Die Impfung gegen Meningokokken ist ab dem vollendeten 2. Lebensmonat möglich. Zur Erzielung eines optimalen Impfschutzes sind abhängig vom Alter bei der Erstimpfung unterschiedliche Schemata zu beachten (vgl. Tabelle im Abschnitt Meningokokken).

Zusätzlich empfohlene Impfungen:

- ab vollendetem 6. Lebensmonat Influenza-Impfung, jährlich

Allgemeiner Impfkalender für Schulkinder

Tabelle 3

Lj.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	Auffrischungsimpfung dip-TET-PEA-IPV*									
Hepatitis B (HBV)	Auffrischungs-Impfung HBV bzw. nachholen der Grundimmunisierung (spätestens bis zum 13. Lebensjahr)									
Humane Papillomviren (HPV)			3x HPV**							
FSME				FSME					FSME	
Konjugierte Meningokokkenimpfung (MEC)					MEC4					
Masern Mumps (MMR, MMRV) Röteln	MMR nachholen wenn nicht immun***									
Windpocken (VZV)		VZV 2x wenn nicht immun***								

* Kinder die schon dT-IPV erhalten haben, sollten nach dem alten Schema weiterlaufen d.h. im 13. LJ dT-PEA erhalten.

** s. Fachinformation; bis zum Alter von 26 Jahren

*** immun bedeutet Erkrankung durchgemacht oder 2x geimpft

Zusätzlich empfohlene Impfungen:

- Influenza-Impfung jährlich

Allgemeiner Impfkalender für Erwachsene

Tabelle 4

Sofern abgeschlossene Grundimmunisierung vorliegt:

18-20 Jahre	30 Jahre	40 Jahre	50 Jahre	60 Jahre	65 Jahre	70 Jahre	75 Jahre u.s.w.
dip TET PEA	dip TET PEA	dip TET PEA	dip TET PEA	dip TET PEA	dip TET PEA	dip TET PEA	dip TET PEA
FSME alle 5 Jahre				FSME alle 3 Jahre			
HPV für Frauen, nachholen							
FLU (Influenza) jährlich			FLU (Influenza) jährlich				
			VZV (Herpes zoster) 1x				
					PNE		

Statt der dip-TET-PEA-Dreifachimpfung kann auch ein Vierfachimpfstoff mit IPV verwendet werden. Dies ist vor allem dann empfehlenswert, wenn Reisen in Kontinente mit Zirkulation mit Polioviren (Afrika, Asien) möglich oder geplant sind.

Zusätzlich empfohlene Impfungen:

- Masern-Mumps-Röteln-Impfung für Erwachsene, welche keine Immunität gegen Masern oder Mumps oder Röteln besitzen; es werden zwei MMR-Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen empfohlen. Besonders für die Altersgruppe von 15-30 Jahren ist auf Grund oft mangelhafter Vorimpfung eine Immunitätsuntersuchung bzw. Impfung empfohlen (vgl. Mumpsausbruch 2006, Masernausbruch 2008, Röteln ausbruch 2009).
- Varizellen-Impfung für seronegative Frauen im gebärfähigen Alter,
- Kinderlähmungsimpfung (IPV) als Indikationsimpfung vor Reisen in Kontinente mit Zirkulation von Polioviren (Afrika, Asien).