


Impfplan Österreich 2020

 **Bundesministerium**
Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz



Legende

 **Impfung empfohlen**
kostenfrei

 **Nachhol-Impfung empfohlen**
kostenfrei

 **Impfung empfohlen**
nicht kostenfrei

 **Nachhol-Impfung empfohlen**
nicht kostenfrei

 **Nachhol-Impfung empfohlen**
zum vergünstigten Selbstkostenpreis

1 1. Dosis

2 2. Dosis

3 3. Dosis

4 4. Dosis

B Boosterimpfung

13 13-valente
Pneumokokkenimpfung

23 23-valente
Pneumokokkenimpfung

Hinweis:

Individuelle Indikationen können zu abweichenden Empfehlungen oder Impfschemata führen.

Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen Intervallen. Empfehlungen zu Darstellungszwecken teils vereinfacht. Details siehe Impfplan Österreich 2020 (verfügbar unter www.sozialministerium.at/impfplan) bzw. entspr. Fachinformation.

Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfungen bei Ver säumnis ehestmöglich nachgeholt werden.

a Bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)

b Wenn nicht zuvor erfolgt, Impfung gegen Pertussis spätestens bei Schulaustritt

c Nach Grundimmunisierung und mindestens zwei Auffrischungsimpfungen im Erwachsenenalter weitere Impfungen nur bei Indikation.

d Kinder mit Risiken bis zum vollendeten 5. Lebensjahr kostenfrei

e Bei Erstimpfung ab dem 1. Geburtstag 2. Impfung frühestmöglich, mit Mindestabstand 4 Wochen

f Impfschema abhängig von Alter und Impfstoff

g Ab vollendetem 15. Lebensjahr 3 Dosen

h Bei Erstimpfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr (off label) oder wenn das Kind bisher erst eine einzige Impfung erhalten hat, 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen; danach 1 jährliche Impfung ausreichend