


# Impfplan Österreich 2018



## Legende

| Empfohlen, kostenfrei | Nachhol-Impfung empfohlen, kostenfrei | Empfohlen, nicht kostenfrei | Nachhol-Impfung empfohlen, nicht kostenfrei | HPV, vollendetes 12.-15. Lebensjahr: Nachholimpfungen zum vergünstigten Selbstkostenpreis |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1                     | 1. Teilimpfung                        | 1                           | 1. Teilimpfung                              |   |
| 2                     | 2. Teilimpfung                        | 2                           | 2. Teilimpfung                              |   |
| 3                     | 3. Teilimpfung                        | 3                           | 3. Teilimpfung                              |   |
| B                     | Boosterimpfung                        | B                           | Boosterimpfung                              |   |
|                       |                                       | 13                          | 13-valente konjugierte Pneumokokkenvakzine  |   |
|                       |                                       | 23                          | 23-valente Polysaccharidvakzine             |   |

**HINWEIS:** Prinzipiell sollte jede der empfohlenen Impfung bei Versäumnis ehestmöglich nachgeholt werden. Zeitangaben innerhalb der Pfeile entsprechen empfohlenen (Mindest-)Intervallen. Detailinformationen zu Impfintervallen (Wochen/Monate, etc.) und Empfehlungen für Nachhol-Impfungen siehe Broschüre Impfplan Österreich 2018 (verfügbar unter [bmgf.gv.at/impfen](http://bmgf.gv.at/impfen)) bzw. entspr. Fachinformation.

a bis zur vollendeten 24. (Rotarix, 2 Dosen) bzw. vollendeten 32. Lebenswoche (Rotateq, 3 Dosen)  
 b wenn im 7.-9. Lebensjahr nur eine dip-Tet-IPV-Auffrischungsimpfung erfolgt ist, spätestens bei Schulaustritt (Pertussis!)  
 c kostenfreies Impfkonzept nur für **Risikokinder**: bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  
 d bei Erstimpfung nach dem 1. Lebensjahr erfolgt die 2. Impfung frühestmöglich, mit einem Mindestabstand von 4 Wochen  
 e ab vollendetem 15. Lebensjahr sind 3 Dosen (0/1(2)/6) notwendig.  
 f bei Impfbeginn 6-11 Monate insgesamt 3 Dosen: 2 Dosen, Abstand mind. 2 Monate; Auffrischung im 2. Lebensjahr, Mindestabstand 2 Monate zu 2. Impfung  
 g bei Impfbeginn 12-23 Monate insgesamt 3 Dosen: 2 Dosen, Abstand mind. 2 Monate; Auffrischung 12-23 Monate nach 2. Dosis  
 h bei Impfbeginn 2-10 Jahre 2 Dosen: Abstand mind. 2 Monate  
 i bei Impfbeginn ab 11 Jahren 2 Dosen: Abstand mind. 1 Monat (unabhängig vom verwendeten Impfstoff gegen MenB)  
 j Konjugierter Men-C Impfstoff: Neisvac C: Impfbeginn vollendetes 2. bis vollendetes 4. Lebensmonat: 2 Dosen im Abstand von mindestens 8 Wochen plus eine Auffrischungsimpfung im 12. oder 13. Lebensmonat. Impfbeginn vollendetes 4. Lebensmonat bis vollendetes 12. Lebensmonat: 1 Impfung plus eine Auffrischungsimpfung vorzugsweise im 12. oder 13. Lebensmonat, in jedem Fall aber mit einem Abstand von mindestens 6 Monaten zur letzten Impfung mit Neisvac C. Menjugate/Meningitec: Impfbeginn vollendetes 2. bis vollendetes 12. Lebensmonat: 2 Dosen im Abstand von mindestens 8 Wochen plus eine Auffrischungsimpfung im 2. Lebensjahr mit einem Abstand von mindestens 6 Monaten. **Ist die Auffrischungsimpfung im 2. Lebensjahr bei begonnener Impfung im ersten Lebensjahr nicht erfolgt, so sollte diese Dosis auch im 3. Lebensjahr oder später (bis vollendetes 10. Lebensjahr) nachgeholt werden.**  
 k Grundimmunisierung: FSME-Immun: 0/1-3 Monate/5-12 Monate nach 2. Impfung; Encepur: 0/1-3 Monate/9-12 Monate nach 2. Impfung  
 l bei Influenza-Erstimmunisierung bis zum vollendeten 8. Lebensjahr 2 Impfungen, Abstand mind. 4 Wochen; dann 1 jährliche Impfung ausreichend